VUE D'ENSEMBLE DE LA SANTÉ EN MARTINIQUE

OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ MARTINIQUE

JANVIER 2025

La population

- **350 000 habitants au 1er janvier 2024**

◊ **Un recul démographique notable :**

⇒ **Variation de population 2015-2021 :**


-0,9 % (contre + 0,3 % au niveau national)

⇒ **La Martinique et la Guadeloupe sont les seules régions d'Outre-mer qui perdent des habitants**

◊ **Un vieillissement marqué, plus important que pour l'ensemble du territoire français (hors Mayotte)**


⇒ **Région ayant la part de personnes de 60 ans et plus la plus élevée (33 % en 2023 contre 24 % en 2013)**

⇒ **Chute de la part des personnes de moins de 25 ans (25 % de la population en 2023 contre 30 % en 2013)**



Pyramide des âges selon le sexe

Source : Insee, RP2021 exploitation principale



Projection de population 2018-2070

Source : Insee, Omphale 2022.

◊ **Une précarité également marquée :**

⇒ **Un niveau de vie médian de 14 % inférieur au niveau national**

⇒ **Un taux de pauvreté deux fois plus important qu'au niveau national**

⇒ **Un taux de chômage supérieur de 3,5 points au niveau national**

Etat de santé de la population

Indicateurs socio-sanitaires

- **Indice de vieillissement : 102**

(nombre de personnes de 65 ans ou plus rapporté au nombre de personnes de moins de 20 ans)

- **Natalité - Fécondité**
  - **3 340 naissances en 2023**
  - **Taux de natalité 2023 : 9,5 ‰**
  - **Indice de fécondité 2023 : 166 %**
  - **Age moyen de la mère : 30,3 ans**

- **Mortalité**
  - **3 820 décès en 2023**
  - **Taux de mortalité 2023 : 10,9 ‰**
  - **Taux de mortalité prématurée (<65 ans) : 2 ‰**
  - **Taux de mortalité infantile (lissé sur 3 ans) : 8 ‰ nés vivants**



Espérance de vie :

- à la naissance : 83,8 ans
- À 60 ans : 27,2 ans

Taux de mortalité : 10 **‰**

Age médian : 48 ans



Espérance de vie :

- à la naissance : 78,2 ans
- À 60 ans : 23,5 ans


Taux de mortalité : 12 **‰**

Age médian : 46 ans

Source : Insee


Perception de la santé

⇒ Etat de santé général



(a) A cause d'un problème de santé dans les activités habituelles, fortement ou non.

⇒ Renoncement aux soins



Les * indiquent une différence significative entre le taux régional et le taux hexagonal à structure démographique semblable, en utilisant les seuils de : *p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001.

Sources : Baromètre santé 2014, Baromètre santé DOM 2014, Inpes

Mortalité générale

- **4 145 décès annuels** moyens ont été enregistrés en Martinique, au cours de la période 2020-2022.
- Les trois principales causes de décès sont :

1. **Les tumeurs** *(885 décès moyens annuels)*
2. **Les maladies de l'appareil circulatoire** *(804 décès moyens annuels)*
3. **Les maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques** *(284 décès moyens annuels)*



1. **Les tumeurs**
2. **Les maladies de l'appareil circulatoire**
3. **Les maladies de l'appareil respiratoire**



- **772 décès prématurés annuels** moyens enregistrés en Martinique au cours de la même période

⇒ Pour cause principale de :

- ◊ **Tumeurs** *(235 décès moyens annuels)*
- ◊ **Maladies de l'appareil circulatoire** *(96 décès moyens annuels)*
- ◊ **Causes externes de morbidité et mortalité** *(82 décès moyens annuels)*

Source : Outil de calcul des ORS, CépiDc 2020-2022, population de référence France hexagonale RP 2020- exploitation OSM

- **Une mortalité infantile plus élevée que la moyenne hexagonale** : en 2021, 33 nourrissons sont décédés au cours de leur première année, soit un taux de mortalité de 7,2 décès pour 1 000 naissances vivantes (contre un taux de 3,5 pour 1 000 dans l'Hexagone).


Source : Insee

Morbidité générale

- **Taux de recours à l'hospitalisation tous champs 2023 par région (standardisé population de référence RP 2021)**

◊ Taux de recours Martinique : 158 pour 1 000 hab.


◊ Taux de recours national : 194 pour 1 000 hab.



- **Taux de recours MCO 2023 par région (standardisé population de référence RP 2021) - ensemble de l'activité (hors séances)**

◊ Taux de recours Martinique : 211 pour 1 000 hab.

◊ Taux de recours national : 289 pour 1 000 hab.



- **Taux de recours HAD 2023 standardisé (RP 2021) :** Martinique 167 journées/ 1000 hab. - France 106
- **Taux de recours SSR 2023 standardisé (RP 2021) :** Martinique 380 journées/ 1000 hab. - France 438
- **Taux de recours PSY 2023 standardisé (RP 2021) :** Martinique 55 journées/ 1000 hab. - France 22

MCO : médecine chirurgie obstétrique, HAD : hospitalisation à domicile, SSR : Soins de suite et réadaptation, PSY : psychiatrie
Source : ATIH

Pathologies

Les cancers

- 1 583 nouveaux cas de cancer par an toutes localisations confondues (dont 61 % chez l'homme) au cours de la période 2007-2016

Cancers les plus fréquents chez la femme :

- 204 nouveaux cas de cancer du sein (33 %)
- 85 nouveaux cas de cancer colorectal (14 %)
- 34 nouveaux cas de cancer de l'estomac et 30 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus (5 % chacun)

Cancers les plus fréquents chez l'homme :

- 530 nouveaux cas de cancer de la prostate (55 %)
- 90 nouveaux cas de cancer colorectal (9 %)
- 43 nouveaux cas de cancer de l'estomac (4 %)

- 729 décès par cancer par an (dont 56 % chez les hommes)
- De fortes disparités pour certaines localisations
  - ◊ Un excès d'incidence et de mortalité pour les cancers de la prostate, du col de l'utérus, de l'estomac et des myélomes multiples
  - ◊ Des incidences plus faibles mais en augmentation pour les cancers du sein, colorectal et du poumon

Source : Joachim-Contaret C, Véronique-Baudin J, Macni J, Ulric-Gervaise S, Cariou M, Billot-Grasset A, Chatignoux É. Estimations régionales et départementales d'incidence et de mortalité par cancers en France, 2007-2016. Martinique. Saint-Maurice : Santé publique France, 2019. 106

Sur dix localisations cancéreuses étudiées, on observe:


- Une survie nette standardisée légèrement supérieure à celle de l'Hexagone en Martinique pour le cancer de la prostate
- Une survie nette standardisée des cancers globalement inférieure à celle de l'Hexagone pour les cancers du sein, du côlon-rectum, du corps de l'utérus et de l'œsophage
- Pas de différence notable avec l'Hexagone en termes de survie pour les cancers suivants: estomac, poumon, col de l'utérus, lèvre-bouche-pharynx, myélome multiple et plasmocytome

Source : Survie des personnes atteintes de cancer en Martinique 2008-2018. Saint-Maurice : Santé publique France, 2024. 43p

Maladies de l'appareil circulatoire

L'hypertension artérielle (HTA)

- L'hypertension artérielle (HTA) constitue le principal facteur de risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) et un facteur de risque important de morbi-mortalité cardiovasculaire en général.
- Prévalence de l'HTA déclarée en 2021 (Baromètre santé 2021) :



Source : Olié V, Gabet A, Grave C, Gautier A, Blacher J. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 2023, n°8, p138-147

- En 2013, la prévalence de l'HTA mesurée en population générale était estimée à 42 % , dont 13 % dépistée au cours de l'enquête et 7 % à un stade d'HTA sévère (enquête Kannari 2013). La prévalence de l'HTA traitée était estimée à 19 %.

Ces résultats seront bientôt actualisés grâce à l'enquête Kannari 2 de 2024.


Source : Santé publique France - Observatoires régionaux de santé de Guadeloupe et Martinique. Enquête Kannari 1

L'accident vasculaire cérébral (AVC)

- Taux de patients hospitalisés pour AVC en 2019 tous sexes confondus pour 100 000 habitants

  Martinique : 213 (262 pour les hommes et 173 pour les femmes)

  Hexagone : 174 (respectivement 215 et 140)



- Taux standardisé de mortalité pour AVC en 2016 tous sexes confondus pour 100 000 habitants

  Martinique : 65 (78 pour les hommes et 56 pour les femmes)


  Hexagone : 39 (respectivement 43 et 35)

- En Martinique, les admissions en affection longue durée pour AVC (ALD 1) représentent en moyenne 486 nouvelles admissions chaque année sur la période 2019-2021 (269 pour les hommes, 216 pour les femmes) ; soit un taux standardisé de 130 admissions pour 100 000 habitants contre 108 dans l'Hexagone. Ce taux est de 162 chez les hommes et 102 chez les femmes (respectivement 115 et 102 au niveau hexagonal).

Source : N.Neller, S. Merle. Fiche thématique 29 octobre : Journée mondiale de lutte contre l'AVC , 2023 2p.

Le diabète

- La maladie est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, à l'exception des territoires ultra-marins où les femmes sont les plus touchées.
- Prévalence du diabète connu en 2021 (Baromètre santé 2021) :



(b) personnes se déclarant non diabétiques qui déclarent tout de même qu'un médecin leur a déjà dit qu'elles avaient un « petit diabète » ou « un début de diabète, mais pas trop grave »

Pathologies

- En 2023, le taux standardisé de diabète traité tous sexes confondus est de 7,9 % (7,7 % chez les hommes et 8,0 % chez les femmes) contre 5,2 % au niveau national (respectivement 6,4 % et 4,3 %).

Source : Santé publique France

- En 2019, les complications les plus fréquemment auto-déclarées par les adultes atteints de diabète de type 2 sont le traitement au laser (17,8 %), la rétinopathie (14,4 %), l'antécédent de mal perforant plantaire (9,9 %) , l'antécédent d'AVC (9,6 %) et la complication coronarienne (8,3 %).

Source : Fosse-Edorh S, Lavalette C, Piffaretti C, Saboni L, Bessonneau P, Mandereau Bruno L, *et al*. Caractéristiques, état de santé et recours aux soins des personnes présentant un diabète de type 2 résidant en outre-mer : résultats de l'étude Entred 3. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(20-21):412-23.

- En 2013, la prévalence du diabète en population générale était estimée à 10 % (enquête Kannari 1 2013)

Ces résultats seront bientôt actualisés grâce à l'enquête Kannari 2 de 2024.

Source : Santé publique France - Observatoires régionaux de santé de Guadeloupe et Martinique. Enquête Kannari 1

L'Insuffisance rénale chronique

- En 2022, 108 patients, résidant en Martinique, ont débuté un premier traitement de suppléance (dialyse ou greffe).
- Le taux d'incidence standardisé de l'insuffisance rénale chronique au stade 5 traitée est de 274 pmh (par million d'habitants) contre 165 pmh au niveau national.
- La maladie rénale initiale la plus représentée est la néphropathie diabétique avec 39,8 % de la totalité des patients, suivie de l'hypertension artérielle avec 13,9 %.
- La prévalence globale de l'insuffisance rénale chronique traitée (par dialyse ou greffe) est sous-estimée car la prévalence des patients transplantés repose sur l'adresse de résidence déclarée par les patients à l'équipe de greffe qui n'est pas toujours celle de leur domicile en Martinique. Après exploitation des données issues des systèmes d'information de l'Agence de biomédecine (Diadem et de Cristal), la prévalence estimée de l'IRCT en Martinique fin 2022 est de 900 patients, soit 2 258 pmh : 212 greffés et 688 dialysés.

Source : A. Bideau, S. Merle, Agence de biomédecine—Observatoire régional de santé de la Martinique, Fiche thématique données REIN 2022

Le handicap

- Les données disponibles relatives aux personnes en situation de handicap en Martinique sont relativement anciennes. Le volet ménages de l'Enquête Handicap Santé de 2008 est la principale source de données mobilisée à ce jour.
- Alors que des données existent, notamment sur le profil des personnes ayant un droit ouvert à la Maison Martiniquaise des Personnes en situation de Handicap de la Martinique (MMPH), les informations sont peu exploitées et ne sont pas diffusées (le territoire est l'un des trois départements absents de la plateforme Handidonnées).

- Au 31 décembre 2021, plus de 28 000 personnes avaient au moins un droit ouvert à la MMPH. De 2011 à 2021, le total des personnes ayant un droit ouvert a augmenté de 81 % . La progression est plus marquée chez les personnes en situation de handicap vieillissantes.
- Les déficiences les plus fréquemment enregistrées à la MMPH sont les déficiences motrices (32,2 %), psychiques (32,1 %), intellectuelles (27,5 %) et viscérales (20,2 %).

Source : Cour des comptes, L'accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes - septembre 2023 79p.

- Selon l'enquête santé européenne (EHIS) 2019, 9 % des 15 ans ou plus sont handicapés dans l'Hexagone contre 11 % dans les DROM une fois la structure par âge calée sur celle de l'Hexagone sauf en Martinique où le niveau atteint 13 %. Les 55 ans et plus sont particulièrement concernés avec une prévalence de 24 % (contre 16 % dans l'Hexagone).

Source : Leduc A, Deroyon T, Rochereau T, Renaud A. Premiers résultats de l'enquête santé européenne (EHIS) 2019 , Les dossiers de la DREES n° 78 , avril 2021. 4p

Santé mentale

- En Martinique, 3,1 % des 18-85 ans déclarent avoir eu des pensées suicidaires et 4,9 % déclarent avoir fait une tentative de suicide au cours des douze derniers mois ;
- 8,1 % déclarent avoir vécu un épisode dépressif caractérisé (EDC) au cours des douze derniers mois en 2021.

Source : Léon C, du Roscoät E, Beck F. Prévalence des pensées suicidaires et tentatives de suicide chez les 18-85 ans en France : résultats du Baromètre santé 2021. Bull Épidémiol Hebd. 2024;(3):42-56.
Léon C, du Roscoät E, Beck F. Prévalence des épisodes dépressifs en France chez les 18-85 ans : résultats du Baromètre santé 2021. Bull Épidémiol Hebd. 2023;(2):28-40.

- 21 % des mères présentent un état de santé mentale dégradé avec des symptômes dépressifs majeurs à 2 mois de suivi postpartum contre 17 % dans l'Hexagone

Source : Rosine J, Lebreton E, Daudens-Vaysse E, Ruster L, Demiguel V, Regnault N. Santé périnatale à la Martinique. Résultats de l'Enquête Nationale Périnatale 2021 dans les DROM (ENP-DROM 2021). Saint-Maurice : Santé publique France, 2023. 142 p.

L'infection à VIH

- En 2022, 49 962 personnes ont été dépistées pour le virus de l'immunodéficience humaine - VIH (remboursées par l'Assurance maladie, hors hospitalisation et hors tests gratuits) en Martinique ; soit un taux brut de 142 dépistages pour 1 000 habitants (contre 65 pour la France entière). Les plus concernés sont les 25-49 ans avec 263 dépistages pour 1 000 (contre 125 pour le niveau national). Le taux de sérologies positives est de 1,5 pour 1 000 sérologies.
- Les femmes sont plus concernées que les hommes avec 161 dépistages pour 1 000 femmes contre 119 dépistages pour 1 000 hommes.
- Comparativement aux autres DROM en 2023, la Martinique se place en 3^{e} position avec un taux de découverte de séropositivité de 229 par million d'habitants (contre 590 en Guyane, 296 à Mayotte, 202 en Guadeloupe et 64 à La Réunion) ; dont 37 % à un stade précoce et 40 % à un stade tardif.

- Selon le CoreVIH, le nombre d'adultes suivis au CHU de Martinique est de 1 171 (dont 65 % d'hommes) en 2023. En termes d'incidence, 49 nouveaux cas (diagnostic et prise en charge au cours de la même année) ont été dénombrés en 2023 (37 hommes et 12 femmes), d'âge médian 37 ans. Parmi eux, 30 ont été diagnostiqués à un stade précoce et 14 à un stade avancé ; 23 avec des symptômes/signes cliniques liés au VIH et 10 sans notion d'exposition au VIH.
- En termes de mortalité, on dénombre en moyenne 5 décès par an au cours de la période 2019-2021. En termes d'admissions en affection longue durée, l'infection au VIH (ALD 7) représente en moyenne 54 nouvelles admissions chaque année sur la période 2020-2022 (42 pour les hommes, 12 pour les femmes).

Source : N. Neller, S. Merle. Fiche thématique 1er décembre : Journée mondiale de lutte contre le Sida, 2024 2p.

Déterminants de santé

Vie sexuelle et Périnatalité

- Recours à l'IVG : 34 % en Martinique en 2021 (contre 39 % en 2016) *vs* 15 % en France hexagonale
- Dernière méthode de contraception utilisée avant grossesse :
  - Baisse du recours à la pilule (50 % contre 61 % en 2016)
  - Mais augmentation de l'utilisation des dispositifs intra-utérins : 12 % en 2021 (contre 9 % en 2016)
- Un taux de prématurité qui semble diminuer : 8,6 % (contre 11,9% en 2016) *vs* 7 % dans l'Hexagone
- Une part plus importante d'enfants avec un petit poids de naissance (≤2500 g) : 10,5 % *vs* 7,1 % dans l'Hexagone

Source : Rosine J, Lebreton E, Daudens-Vaysse E, Ruster L, Demiguel V, Regnault N. Santé périnatale à la Martinique. Résultats de l'Enquête Nationale Périnatale 2021 dans les DROM (ENP-DROM 2021). Saint-Maurice : Santé publique France, 2023. 142 p.

Statut pondéral - activité physique

- En 2013, la prévalence de la surcharge pondérale était estimée à 58,8 % chez les adultes et 34,7 % chez les enfants en Martinique. La prévalence du surpoids était estimée à 31,1 % et celle de l'obésité à 27,7 % chez les adultes. Chez les enfants, ces estimations étaient respectivement de 25,2 % et 9,4 %.

Ces résultat seront bientôt actualisés grâce à l'enquête Kannari 2 de 2024

Source : Santé publique France - Observatoires régionaux de santé de Guadeloupe et Martinique. Enquête Kannari 1

- En 2021, la prévalence d'atteinte des recommandations d'activité physique en Martinique est significativement inférieure au niveau national (71,9 % chez les hommes, 55,4 % chez les femmes contre respectivement 72,9 % et 59,3 %)
- La prévalence de la sédentarité (temps assis>7h/j) en Martinique est significativement inférieure à celle du niveau national (16,3 % chez les hommes, 15,6 % chez les femmes contre respectivement 23,3 % et 22,2 %)

Source : Verdot C, Salanave B, Escalon H, Deschamps V. Prévalences nationales et régionales de l'activité physique et de la sédentarité des adultes en France : résultats du Baromètre de Santé publique France 2021. Bull Épidémiol Hebd. 2024;(12):240-9.

Consommation de substances psychoactives

La Martinique se caractérise par une consommation de tabac nettement inférieure à celle relevée dans l'Hexagone. En 2014, le tabagisme quotidien concernait 15,9 % de la population adulte , contre 26,9 % au niveau national en 2017 (Santé publique France, 2019). L'usage des autres substances psychoactives en Martinique a longtemps davantage concerné l'alcool, puis l'herbe de cannabis. Les dernières enquêtes en population générale adulte indiquent une part d'expérimentation significativement supérieure dans l'Hexagone (42 % contre 25 %), mais une part d'usagers réguliers équivalente en Martinique et dans l'Hexagone (3 %) (Spilka *et al*., 2017). Les usagers interrogés déclarent une initiation précoce avec un début de consommation entre 10 et 16 ans en Martinique.

L'expérimentation de cocaïne basée concerne 0,3 % de la population de Martinique entre 15 et 64 ans en 2014, contre 0,6 % en France hexagonale (Spilka *et al*., 2017).

En 2014, 1,3 % de la population adulte de Martinique a expérimenté la cocaïne sous forme chlorhydrate, contre 5,4 % en France hexagonale (Spilka *et al.*, 2017).

Source : Longuet I, Gérome C (OFDT), Merle S, Neller N, Thirot M, Zobda-Zebina M (OSM), Pratiques d'usages et de prise en charge des usagers de drogues en Martinique en 2022– Note OFDT 2024 19 p

En 2023, les niveaux de consommation d'alcool, d'ivresse récente et de cigarette électronique des collégiens martiniquais sont significativement plus élevés que ceux mesurés chez les collégiens de l'Hexagone.

En termes d'initiations, plus de la moitié des collégiens ont déjà bu de l'alcool au cours de leur vie dans les DROM contre 43,4 % dans l'Hexagone.

En Martinique, à la fin du collège :

- 56,2 % disent avoir déjà consommé une boisson alcoolisée contre 43,4 % dans l'Hexagone
- Ils sont 12,6 % à avoir déjà bu « au point d'être complètement ivre » contre 9,9 % dans l'Hexagone
- La survenue d'un épisode d'ivresse au cours des 30 jours précédant l'enquête concerne 7,2 % des collégiens contre 3,6 % dans l'Hexagone
- De même, l'usage régulier d'alcool concerne 5,0 % des collégiens en Martinique contre 2,1 % dans l'Hexagone
- Les alcoolisations ponctuelles importantes (API) sont elles aussi plus répandues en Martinique avec 25,9 % des collégiens qui déclarent une API récente (au moins une fois dans les 30 derniers jours) et 9,2 % qui déclarent des API répétées (au moins trois fois dans les 30 derniers jours) contre respectivement 14,6 % et 4,2 % dans l'Hexagone.

Chez les lycéens, les niveaux de consommation d'alcool en Martinique en 2023 sont assez proches de ceux observés dans l'Hexagone en 2022 (52,5 % de consommation récente, 8,1 % d'usage régulier, 34,9 % d'API et 16,2 % d'ivresses répétées), en dehors de l'expérimentation qui est significativement plus élevée en Martinique (77,7 % contre 68,3 %). En revanche, concernant l'expérimentation et l'usage quotidien de cigarette de tabac, les lycéens sont nettement moins concernés que leurs homologues de l'Hexagone. Pour ce qui est des usages de la chicha, les niveaux de consommation sont proches de ceux observés dans l'Hexagone.

La Martinique se distingue des autres DROM par un usage plus fréquent de la e-cigarette (30,7 % des lycéens déclarent un usage récent contre 24,2 % dans l'Hexagone, 18,8 % en Guadeloupe, 18,4 % à La Réunion et 18,0 % en Guyane).

L'expérimentation du cannabis est moins répandue en Martinique que dans l'Hexagone (13,3 % d'expérimentation, 8,4 % d'usage actuel et 5,4 % d'usage récent contre respectivement 22,5 % , 17,6 % et 10,6 %).

Notons que tout comme en France hexagonale, les tendances d'usages de substances psychoactives en Martinique ont fortement diminué parmi les adolescents durant les dernières années.

Source : Philippon A, Le Nézet O, Spilka S. Les usages de drogues chez les adolescents de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion - Résultats EnCLASS 2022-2023. Note de résultats. Paris, OFDT, 2024, 15 p.

Au cours de la grossesse :

- 5,3 % des femmes déclarent être fumeuses au cours du 3^{e} trimestre (contre 12,2 % dans l'Hexagone) et 3,3 % déclarent avoir consommé du cannabis au cours de la grossesse (contre 1,1 % dans l'Hexagone)
- 4,5 % des femmes déclarent avoir consommé de l 'alcool durant la grossesse (contre 3,1 % dans l'Hexagone)

Source : Rosine J, Lebreton E, Daudens-Vaysse E, Ruster L, Demiguel V, Regnault N. Santé périnatale à la Martinique. Résultats de l'Enquête Nationale Périnatale 2021 dans les DROM (ENP-DROM 2021). Saint-Maurice : Santé publique France, 2023. 142 p.

Natacha NELLER, Sylvie MERLE. Observatoire de la santé de la Martinique (OSM), ors.martiniq@wanadoo.fr— 0596 61 28 20. www.ors-martinique.fr