



DIAGNOSTIC POUR L'ÉLABORATION DU PRS 2 M A R T I N I Q U E

2018 • 2022


K. MELAN, N NELLER, S. MERLE
Observatoire de la santé de la Martinique
Séminaire du 20 avril 2017

Déterminants de la santé

Hygiène de vie

► Alimentation

Sources : enquête Kannari et enquête jeunes de 16 à 25 ans en difficultés d'insertion



- **Consommation d'au moins 400 g de fruits et légumes**
 - 1 enfant sur 6 en Martinique
 - 1 adulte sur 4 en Martinique
- **Consommation de produits laitiers**
 - Recommandations PNNS : 3 à 4 portions par jour
 - Enfants : moins de 2 portions par jour en moyenne
 - 9 adultes sur 10 déclarent des consommations inférieures aux recos
- **Consommation en viande, poissons, œufs**
 - 1 adulte sur 4 dépasse les recommandations
- **Fréquentation des fast food**
 - 33 % des jeunes à faibles ressources au moins 1 fois par semaine
 - 5,3 % des jeunes à faibles ressources 4 à 5 fois par semaine

Hygiène de vie

► Pratique d'une activité physique moins d'une fois par semaine

► Pratique d'une activité physique régulière (4 à 5 fois par semaine)



Nutrition

Activité physique

Surcharge pondérale

► Activité physique

Source : Baromètre santé 2014



Progression de la prévalence de la surcharge pondérale en 10 ans

Définition du surpoids et de l'obésité

18 ans et plus	
Surpoids	IMC (Poids Kg/ Taille ² m ²) 25 ≤ IMC < 30
Obésité	IMC ≥ 30
Enfants	
	Normes IOTF en fonction du sexe et de l'âge

Adultes
16 ans et +

2003
Escal

2013
Kannari

Surpoids

33,3 %

31,1 %

Obésité


20,0 %

27,7 %

Surcharge
pondérale

53,3 %

58,8 %



+ 5,5 % dont 1,7 % lié au
vieillessement de la
population (standardisation
effectifs d'Escal sur RP 2013)

Enfants
3-15 ans

2003
Escal

2013
Kannari

Surpoids

15,7 %

25,2 %

Obésité

7,9 %

9,5 %

Surcharge
pondérale

26,6 %



34,7 %



Pour les enfants, les résultats sont à prendre avec précaution du fait des petits effectifs dans l'enquête Kannari

Surcharge pondérale selon le sexe et l'âge

Adultes (16 ans et +)




Facteurs associés à la surcharge pondérale (analyses selon le sexe)

* Chez les femmes (les plus concernées, surtout par l'obésité)


- Le lieu de naissance : Antilles > Autre
- Le diplôme : inférieur au bac > supérieur ou équivalent au bac
- La précarité : perception de minimas sociaux > non perception

* Aucune caractéristique sociodémographique significative chez les hommes

Obésité abdominale selon le sexe et l'âge



Escal ⇨ Kannari : + 2 cm de tour de taille en 10 ans



Facteurs associés à l'obésité abdominale

- Femmes :
 - L'âge : 65 ans et plus > moins de 65 ans
 - Le lieu de naissance : Antilles > Autre
 - Le diplôme : inférieur au bac > supérieur ou équivalent au bac
- Hommes :
 - L'âge : 65 ans et plus > moins de 65 ans

Sexualité

Source : « Les habitants des Antilles et de la Guyane face au Vih/sida et à d'autres risques sexuels » 2011, Inpes, ORS IDF

- ▶ **Age médian au 1^{er} rapport**
 - ▶ 18 ans chez les femmes
 - ▶ 16 ans chez les hommes
- ▶ **Multi-partenariat déclaré au cours des 5 dernières années**
 - ▶ 60,6 % chez les hommes
 - ▶ 34,3 % chez les femmes
 - ▶ Inversement proportionnel à l'âge
- ▶ **Niveau de connaissance**
 - ▶ Mode de transmission du VIH bien connu de la majorité des martiniquais (99 %)
 - ▶ Mais persistance de certaines croyances
 - ▶ 90 % considèrent que le préservatif est une protection efficace contre le VIH

Sexualité/VIH

- ▶ **4^e région de France** la plus touchée par le VIH
- ▶ En moyenne, **plus de 50 nouvelles découvertes** de séropositivité chaque année
- ▶ **63 %** des cas sont des hommes

- ▶ 1^{er} mode de transmission VIH : rapports hétérosexuels
- ▶ **Mode de découverte**
 - ▶ Présence de signes cliniques et biologiques (28 %)
 - ▶ Bilan systématique (16 %)
 - ▶ Exposition au VIH (12 %)
 - ▶ Suivi de grossesse (6 %)
- ▶ **800 cas de SIDA déclarés** en Martinique depuis le début de l'épidémie (1984)
- ▶ **Morbidité hospitalière** [2013-2015]
 - ▶ 1 séjour pour maladies infectieuses sur 5
 - ▶ 414 séjours annuels pour infection à VIH en soins de courte durée
- ▶ **Mortalité** [2007-2013]
 - ▶ Forte baisse de la mortalité depuis trithérapie, près de 9 décès par an

Addictions

▶ Le tabac

- ▶ Une des plus basses consommations de toutes les régions de France (jeunes et adultes)
- ▶ Qui se confirme au niveau des indicateurs sanitaires (cancer du poumon, cardiopathies ischémiques)

▶ L'alcool


- ▶ Consommations en hausse chez les jeunes (recherche d'ivresse)
- ▶ Plus de consommateurs réguliers ou à risque chez les hommes que chez les femmes
- ▶ Prédominance des boissons importées (champagne) mais aussi de la bière chez les hommes de 18 à 34 ans

▶ Les produits interdits par la loi

- ▶ Prédominance des produits qui se fument (cannabis, crack) + cocaïne
- ▶ Niveaux de consommation déclarés plus bas que dans l'Hexagone mais apparente discordance avec d'autres techniques de mesure (eaux usées)

Accidents

► Survenue d'un accident au cours des douze derniers mois ayant entraîné une consultation chez un médecin ou dans un hôpital



Source : Baromètre santé DOM 2014

Accidents

▶ Accidents de la vie courante

▶ Morbidité

- ▶ 5058 séjours hospitaliers avec pour diagnostic « lésions, empoisonnement ou autres conséquences de causes externes »
- ▶ 3,5 % de l'ensemble des séjours en soins de courte durée MCO


▶ Mortalité

- ▶ En moyenne 82 décès par an (2010-2013)
- ▶ Taux standardisé de mortalité
 - ▶ 25,0 pour 100 000 hab. en Martinique
 - ▶ vs 33,2 pour 100 000 hab. dans l'Hexagone
 - ▶ Taux le plus faible des régions françaises

Accidents

► Accidents de la circulation

► Evolution de l'accidentalité en Martinique



- ### ► Facteurs associés aux accidents
- ❖ Jeune âge
 - ❖ Alcoolémie positive
 - ❖ Vitesse
 - ❖ Non port du casque
 - ❖ Non port de la ceinture

Source : Préfecture de la Martinique


Santé et travail

- ▶ Accidents du travail
- ▶ Maladies professionnelles

Source : CGSS Martinique

En 2013

- ▶ 2 071 accidents du travail
- ▶ Indice de fréquence : 23 en Martinique vs 34 en national
- ▶ Une cinquantaine d'accidents du travail graves par an




- ▶ Evolution du nombre de maladies professionnelles reconnues en Martinique de 2004 à 2013

❖ Prédominance des troubles musculo-squelettiques

Plus de 5000 salariés susceptibles d'être exposés à l'amiante en Martinique (source : Dieccte)

Environnement

► Zone d'interdiction de pêche liée à la présence de chloredécone



-  tout type de pêche interdit
-  pêche de langouste interdite

► Qualité de l'eau




Environnement

► Risque de contamination des sols par le chloredécone

► 2/5^e des parcelles agricoles polluées par le chloredécone

Source : SIG Chambre d'agriculture

► Qualité des sols



Environnement

► Bilan de l'année 2015 globalement bon

► Malgré ...


❖ De très nombreux dépassements en particules fines, la Martinique étant régulièrement touchée par le phénomène de brume des sables

❖ Des productions de sulfure d'hydrogène provoquées par les sargasses

► Qualité de l'air

Source : Madininair

► Indice ATMO sur Fort-de-France, Lamentin et Schoelcher en 2015





**DIAGNOSTIC POUR
L'ÉLABORATION DU PRS 2
M A R T I N I Q U E**

2018 • 2022